

ACCIDENT DENTAIRE

QUE FAIRE ?

Les dents permanentes peuvent très souvent être sauvées en respectant quelques recommandations :

1. Gardez votre calme
2. En cas d'hémorragie, compressez la zone concernée par exemple en mordant sur un tissu et si possible refroidissez l'extérieur en appliquant un linge rempli de glaçons.
3. Trois situations :
 - La dent est fracturée : Essayez de retrouver le morceau fracturé et conservez-le dans du lait ou de l'eau.
 - La dent est fortement mobile ou déplacée : Ne touchez pas à la dent, mais serrez les dents prudemment.
 - La dent est arrachée : Essayez absolument de retrouver la dent. Ne touchez que la couronne de la dent et pas la racine. Si la dent est visiblement pas sale remettez-la à sa place. Si elle est sale, ne nettoyez surtout pas la dent! Conservez la dent en milieu humide dans l'ordre de préférence : Dans une boîte de sauvetage spéciale (Dentosafe®), dans de l'eau saline stérile que l'on trouve en pharmacie, dans du lait froid, dans la bouche.
4. Consultez immédiatement votre médecin-dentiste ou le médecin-dentiste de garde

Suite à la réimplantation d'une dent, assurez-vous que vous êtes vacciné contre le tétanos.

Si la dent a été heurtée avec éventuellement une petite mobilité ou si c'est une dent de lait, il n'y a pas urgence. Mais prenez rendez-vous avec votre médecin-dentiste et annoncez le cas à votre assurance accident. La dent peut avoir une fracture de la racine ou par la suite perdre sa vitalité.

L'assurance paie les conséquences d'un accident même plusieurs années plus tard si cela a été confirmé et déclaré par un médecin-dentiste.